

Tavola 2.1: Misure di associazione (odds ratio) fra caratteristiche degli studenti e consumo di sostanze psicoattive illegali.

FATTORI ASSOCIATI	ODDS RATIO (I.C. 95%)				
	<i>consumo di eroina negli ultimi 12 mesi</i>	<i>consumo di cocaina negli ultimi 12 mesi</i>	<i>consumo di alcol negli ultimi 30 giorni</i>	<i>consumo di tabacco negli ultimi 30 giorni (almeno una al giorno)</i>	<i>consumo di cannabis negli ultimi 12 mesi</i>
aver fatto uso di tranquillanti e/o sedativi (psicofarmaci) senza prescrizione medica	17.462 (14.256-21.388)*	7.043 (5.904-8.403)*	2.264 (1.902-2.696)*	2.466 (2.142-2.840)*	3.072 (2.684-3.516)*
avere fratelli che abusano di alcol o fanno uso di droghe	7.258 (5.571-9.456)*	8.612 (7.181-10.329)*	5.092 (4.460-5.814)*	4.478 (4.046-4.955)*	11.066 (9.965-12.288)*
aver fatto uso di tranquillanti e/o sedativi (psicofarmaci) con prescrizione medica	6.241 (4.551-8.558)*	3.917 (3.056-5.020)*	1.394 (1.144-1.699)*	1.999 (1.674-2.388)*	2.007 (1.687-2.388)*
aver avuto rapporti sessuali non protetti	5.647 (4.761-6.699)*	5.246 (4.696-5.860)*	2.055 (1.902-2.221)*	3.011 (2.822-3.213)*	3.157 (2.965-3.360)*
aver partecipato spesso a giochi in cui si spendono soldi	4.838 (3.930-5.956)*	4.377 (3.809-5.030)*	1.995 (1.798-2.215)*	2.190 (2.003-2.395)*	2.141 (1.967-2.331)*
aver perso 3 o più giorni di scuola nell'ultimo mese senza motivo (aver scarsa motivazione ad andare a scuola)	3.858 (3.134-4.748)*	4.400 (3.820-5.068)*	1.675 (1.576-1.781)*	2.695 (2.530-2.871)*	2.629 (2.471-2.797)*
essere stati coinvolti in risse	3.568 (2.911-4.371)*	3.143 (2.769-3.566)*	1.904 (1.816-1.996)*	2.005 (1.903-2.113)*	1.940 (1.843-2.041)*
essere stati coinvolti in incidenti	1.765 (1.493-2.086)*	1.730 (1.553-1.928)*	1.375 (1.311-1.441)*	1.294 (1.230-1.362)*	1.244 (1.184-1.307)*
essere stati ricoverati in ospedale/pronto soccorso	1.431 (1.212-1.690)*	1.042 (0.934-1.163)	1.160 (1.106-1.217)*	1.012 (0.961-1.066)	0.998 (0.948-1.050)
fare spesso attività sportiva	0.888 (0.714-1.105)	0.881 (0.765-1.014)	1.458 (1.370-1.551)*	0.705 (0.658-0.755)*	0.977 (0.913-1.045)
avere una condizione economica medio-alta	0.588 (0.460-0.750)*	0.659 (0.561-0.774)*	1.095 (1.010-1.188)*	0.715 (0.658-0.778)*	0.826 (0.759-0.897)*
avere alta percezione del rischio di far uso di droghe	0.395 (0.333-0.468)*	0.473 (0.422-0.530)*	0.947 (0.893-1.004)	0.646 (0.608-0.687)*	0.607 (0.572-0.643)*
avere un rendimento scolastico medio-alto	0.339 (0.273-0.422)*	0.322 (0.280-0.371)*	0.663 (0.600-0.733)*	0.368 (0.336-0.402)*	0.435 (0.399-0.475)*
essere soddisfatto del rapporto con i genitori	0.256 (0.200-0.327)*	0.355 (0.296-0.427)*	0.746 (0.663-0.839)*	0.513 (0.459-0.574)*	0.492 (0.442-0.549)*
percepire attenzione da parte dei genitori	0.245 (0.207-0.291)*	0.298 (0.267-0.334)*	0.445 (0.413-0.479)*	0.413 (0.388-0.440)*	0.365 (0.343-0.388)*
non essersi ubriacato nell'ultimo mese	0.037 (0.026-0.052)*	0.019 (0.014-0.026)*	-	0.062 (0.057-0.068)*	0.034 (0.031-0.038)*
non essere fumatore	0.016 (0.009-0.026)*	0.018 (0.013-0.024)*	0.154 (0.140-0.169)*	-	0.010 (0.009-0.012)*

* valori significativi (p<0,05).

Nota: i valori degli odds ratio sono stati calcolati con modelli di regressione logistica, utilizzando come variabile dipendente l'uso o meno della sostanza in questione.

Elaborazione sui dati del Progetto ESPAD®Italia