

**Tavola 5.1 - Misure di associazione (odds ratio) tra trattamenti farmacologicamente assistiti non integrati (rispetto a quelli integrati) ed alcune caratteristiche socio-demografiche dell'utenza in carico nei SerT.**

<b>Trattamenti farmacologicamente assistiti non integrati</b>	<b>odds ratio (I.C. 95%)</b>
femmine vs. maschi	<b>1,021</b> (0,918-1,135)
soggetti nuovi vs. già in carico	<b>1,344</b> (1,196-1,510)*
età ≥35 vs. <34 anni	<b>1,520</b> (1,409-1,639)*
oppiacei vs. altre illegali	<b>2,018</b> (1,280-3,182)*
cocaina vs. altre illegali	<b>1,334</b> (0,813-2,189)
cannabis vs. altre illegali	<b>1,588</b> (0,926-2,723)

\* valori significativi (p<0,05).

Nota: i valori degli odds ratio sono stati stimati con modelli di regressione logistica, utilizzando come variabile dipendente il fatto di ricevere un trattamento farmacologicamente assistito non integrato, rispetto al trattamento integrato.

Elaborazioni sui dati del Progetto SIMI@Italia

**Tavola 5.2 - Misure di associazione (odds ratio) tra trattamenti farmacologicamente assistiti con metadone (rispetto a quelli con buprenorfina) ed alcune caratteristiche socio-demografiche dell'utenza in carico nei SerT.**

<b>Trattamenti farmacologicamente assistiti con metadone (rispetto alla buprenorfina)</b>	<b>odds ratio (I.C. 95%)</b>
femmine vs. maschi	<b>1,370</b> (1,189-1,578)*
soggetti già in carico vs. nuovi	<b>1,099</b> (0,950-1,270)
età >=35 vs. <34 anni	<b>1,582</b> (1,439-1,740)*
oppiacei vs. altre illegali	<b>0,896</b> (0,459-1,749)
cocaina vs. altre illegali	<b>0,483</b> (0,236-0,989)*
cannabis vs. altre illegali	<b>0,626</b> (0,294-1,336)

\* valori significativi ( $p < 0,05$ ).

Nota: i valori degli odds ratio sono stati stimati con modelli di regressione logistica, utilizzando come variabile dipendente il fatto di ricevere un trattamento farmacologicamente assistito con metadone, rispetto alla buprenorfina.

Elaborazioni sui dati del Progetto SIMI®Italia

**Tavola 5.3 - Misure di associazione (odds ratio) tra trattamenti farmacologicamente assistiti (rispetto a quelli esclusivamente psicosociali) ed alcune caratteristiche socio-demografiche dell'utenza inviata nelle Comunità Terapeutiche.**

<b>Trattamenti farmacologicamente assistiti</b>	<b>odds ratio (I.C. 95%)</b>
femmine vs. maschi	<b>1,870</b> (1,359-2,578)*
soggetti già in carico vs. nuovi	<b>1,020</b> (0,780-1,320)
età $\geq 35$ vs. $< 34$ anni	<b>1,035</b> (0,839-1,280)
cocaina vs. oppiacei	<b>0,476</b> (0,349-0,649)*
cannabis vs. oppiacei	<b>0,353</b> (0,196-0,659)*
altre illegali	<b>1,061</b> (0,454-2,516)

\* valori significativi ( $p < 0,05$ ).

Nota: i valori degli odds ratio sono stati stimati con modelli di regressione logistica, utilizzando come variabile dipendente il fatto di ricevere un trattamento farmacologicamente assistito, rispetto al trattamento esclusivamente psicosociale.

Elaborazioni sui dati del Progetto SIMI® Italia