

ISPESL

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
DIPARTIMENTO DI MEDICINA DEL LAVORO
LABORATORIO DI EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA SANITARIA OCCUPAZIONALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
prof. Antonio Moccaldi

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Umberto Sacerdote

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA DEL LAVORO
dott. Sergio Iavicoli

**IL REGISTRO NAZIONALE
DEI MESOTELIOMI**

(RENaM)

(DPCM 308/2002)

Terzo Rapporto

Roma maggio 2010

Tabella 7. Numero di casi di mesotelioma segnalati al ReNaM per definizione dell'esposizione e genere. (Italia, 1993-2004, N=9.166)

	GENERE		Totale
	Uomini	Donne	
Esposizione definita	4988	1652	6640
	75,1%	65,4%	72,4%
Esposizione non definita	1652	874	2526
	24,9%	34,6%	27,6%
Totale	6640	2526	9166
	100,0%	100,0%	100,0%

Tabella 8. Numero di casi di mesotelioma segnalati al ReNaM per definizione dell'esposizione e sede anatomica di insorgenza per genere. (Italia, 1993-2004, N=9.166)

	SEDE ANATOMICA DI INSORGENZA				Totale
	Pleura	Peritoneo	Pericardio	Tunica vaginale del testicolo	
Esposizione definita	6203	396	21	20	6640
	73,1%	64,5%	58,3%	64,5%	72,4%
Esposizione non definita	2282	218	15	11	2526
	26,9%	35,5%	41,7%	35,5%	27,6%
Totale	8485	614	36	31	9166
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabella 9. Numero di casi di mesotelioma segnalati al ReNaM con esposizione definita per tipo di esposizione e genere. (Italia, 1993-2004, N=6.640)

	Genere		Totale
	Uomini	Donne	
1. Esposizione professionale certa	2773 55,6%	293 17,7%	3066 46,2%
2. Esposizione professionale probabile	570 11,4%	65 3,9%	635 9,6%
3. Esposizione professionale possibile	741 14,9%	195 11,8%	936 14,1%
4. Esposizione familiare	50 1,0%	251 15,2%	301 4,5%
5. Esposizione ambientale	137 2,7%	175 10,6%	312 4,7%
6. Esposizione per attività tempo libero	46 ,9%	47 2,8%	93 1,4%
7. Esposizione improbabile	131 2,6%	147 8,9%	278 4,2%
8. Esposizione ignota	540 10,8%	479 29,0%	1019 15,3%
Totale	4988 100,0%	1652 100,0%	6640 100,0%

Tabella 10. Numero di casi di mesotelioma segnalati al ReNaM con esposizione definita per tipo di esposizione e sede anatomica di insorgenza. (Italia, 1993-2004, N=6.640)

	SEDE ANATOMICA DI INSORGENZA				Totale
	Pleura	Peritoneo	Pericardio	Tunica vaginale del testicolo	
1. Esposizione professionale certa	2879 46,4%	176 44,4%	5 23,8%	6 30,0%	3066 46,2%
2. Esposizione professionale probabile	612 9,9%	22 5,6%	0 0,0%	1 5,0%	635 9,6%
3. Esposizione professionale possibile	883 14,2%	40 10,1%	7 33,3%	6 30,0%	936 14,1%
4. Esposizione familiare	286 4,6%	15 3,8%	0 0,0%	0 0,0%	301 4,5%
5. Esposizione ambientale	294 4,7%	17 4,3%	1 4,8%	0 0,0%	312 4,7%
6. Esposizione per attività tempo libero	86 1,4%	6 1,5%	0 0,0%	1 5,0%	93 1,4%
7. Esposizione improbabile	242 3,9%	32 8,1%	3 14,3%	1 5,0%	278 4,2%
8. Esposizione ignota	921 14,8%	88 22,2%	5 23,8%	5 25,0%	1019 15,3%
Totale	6203 100,0%	396 100,0%	21 100,0%	20 100,0%	6640 100,0%

Tabella 11. Numero di casi di mesotelioma segnalati al ReNaM per definizione dell'esposizione e Regione. (Italia, 1993-2004, N=9.166)

	Definizione dell'esposizione		Totale
	Esposizione definita	Esposizione non definita	
Piemonte	1088	875	1963
	55,4%	44,6%	100,0%
Valle d'Aosta	7	10	17
	41,2%	58,8%	100,0%
Lombardia	929	96	1025
	90,6%	9,4%	100,0%
Veneto	770	86	856
	90,0%	10,0%	100,0%
Friuli Venezia-Giulia	349	54	403
	86,6%	13,4%	100,0%
Liguria	1078	168	1246
	86,5%	13,5%	100,0%
Emilia-Romagna	679	328	1007
	67,4%	32,6%	100,0%
Toscana	619	45	664
	93,2%	6,8%	100,0%
Marche	167	65	232
	72,0%	28,0%	100,0%
Lazio	31	140	171
	18,1%	81,9%	100,0%
Abruzzo	17	9	26
	65,4%	34,6%	100,0%
Campania	153	344	497
	30,8%	69,2%	100,0%
Puglia	458	20	478
	95,8%	4,2%	100,0%
Basilicata	22	2	24
	91,7%	8,3%	100,0%
Calabria	0	6	6
	0,0%	100,0%	100,0%
Sicilia	244	277	521
	46,8%	53,2%	100,0%
Sardegna	29	1	30
	96,7%	3,3%	100,0%
Totale	6640	2526	9166
	72,4%	27,6%	100,0%